

بررسی مقاومت استافیلوکوکوس اورثوس در برابر وانکومایسین

محبوبه نادری نسب^۱، پریسا فاتح منش^۲، بهار شهنازی^۳

چکیده

مقدمه : در دهه ۱۹۵۰ وانکومایسین^۴ به عنوان یک آنتی بیوتیک مفید جهت درمان عفونت های حاصل از سوش های استافیلوکوکوس اورثوس مقاوم به متی سیلین^۵ معرفی گردید پس از گذشت سه دهه از مصرف وانکومایسین، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی مقاوم به آن گزارش شد. در این مطالعه به بررسی مقاومت استافیلوکوک ها نسبت به این آنتی بیوتیک پرداخته شد.

روش کار : در این بررسی به مدت ۶ ماه ۵۰ نمونه استافیلوکوکوس اورثوس جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) و به همان تعداد باکتری جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مورد آزمایش قرار گرفتند. تمام استافیلوکوک های انتخاب شده جهت آزمایش نسبت به متی سیلین مقاوم بودند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد^۶ (MIC) آن ها نسبت به وانکومایسین اندازه گیری شد.

نتایج : از ۵۰ باکتری جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، ۴ مورد در برابر وانکومایسین دارای MIC معادل ۱۲/۵ میکروگرم در میلی لیتر بودند. در باکتری های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج)، ۱ مورد دارای MIC معادل ۱۲/۵ میکروگرم در میلی لیتر بود.

نتیجه گیری : با توجه به گسترش مقاومت نسبت به وانکومایسین پیشنهاد می گردد سعی شود که در بخش های بیمارستانی از جایگزین شدن این گونه باکتری های مقاوم ممانعت به عمل آورده شود.

وازگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورثوس ، وانکومایسین ، مشهد

مقدمه

استافیلوکوکوس اورثوس یکی از مهم ترین پاتوژن ها و یک عامل مهم عفونت های بیمارستانی محسوب می گردد. در بیمارستان ها نه تنها بیماری های استافیلوکوکی زیادتر و موجبات انتقال آن ها فراهم تر است بلکه تعداد ناقلان سالم در بین پرستاران، پزشکان و سایر کارمندان فنی نیز بیشتر است؛ به این جهت هر اندازه مدت بستری شدن اشخاص در بیمارستان بیشتر باشد،

- ۱- استادیار گروه میکروب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
- ۲- کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
- ۳- کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
- 4- Vancomycin.
- 5- Meticillin resistant to Staphilococcus aureus (MRSA).
- 6- Minimal inhibitory concentration (MIC).

میلی لیتر و انکومایسین رشد آن مهار می گردد. سوش هایی که دارای MIC کمتر از این مقدار باشند، حساس و سوش هایی که MIC آن ها معادل ۳۲ میکروگرم در میلی لیتر یا بیشتر باشند، مقاوم محسوب می گردند. موارد MRSA که VISA بودند در کشورهای ژاپن (۷)، آمریکا (۸)، فرانسه (۹)، کره (۱۰)، تایلند (۱۱)، ایتالیا (۱۲)، و آلمان (۱۳) گزارش شده است.

در شیراز در سال ۲۰۰۰ در یک بررسی هیچ یک از باکتری های جدا شده از بیماران نسبت به وانکومایسین مقاومت نشان ندادند (۱۴). در عربستان سعودی در یک بررسی به عمل آمده از استافیلوکوک های جدا شده از افراد بیمارستان و افراد خارج از بیمارستان، هیچ یک از باکتری های جدا شده نسبت به وانکومایسین مقاوم نبودند (۱۵).

در سال ۱۳۷۹ به بررسی میزان حساسیت ۱۰۰۰ مورد استافیلوکوک نسبت به وانکومایسین پرداختیم (باکتری های جدا شده از عفونت های مختلف و از نقاط مختلف شهر مشهد)، تمام باکتری ها نسبت به این آنتی بیوتیک حساس بودند (۱۶).

با توجه به این که در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در بخش سوختگی جهت درمان عفونت های سوختگی حاصل از استافیلوکوک ها به میزان وسیعی از وانکومایسین استفاده می شود و در سال های اخیر نیز موارد حد واسطه به این آنتی بیوتیک در آزمایشگاه جدا گردیده است؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تعیین میزان حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد جهت این آنتی بیوتیک پرداختیم.

احتمال ابتلا به عفونت های استافیلوکوکی نیز بیشتر خواهد بود (۱).

در سال های ۱۹۴۰ بعضی از سوش های استافیلوکوک به پنی سیلین مقاوم شدند در یک دهه بعد سوش های مقاوم چند گانه به تتراسیکلین، کلرامفینیکل و اریترومایسین گزارش شد. در سال های ۱۹۶۰ متی سیلین و آنتی بیوتیک های بتا لاکتام موثر بر سوش های استافیلوکوکوس اورثوس مقاوم به پنی سیلین مورد استفاده قرار گرفت، اما به زودی سوش های استافیلوکوکوس اورثوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) ظاهر گردیدند. در دهه ۱۹۵۰ وانکومایسین به عنوان یک آنتی بیوتیک مفید جهت درمان عفونت های حاصل از MRSA معرفی گردید و تقریباً سه دهه بعد از استفاده از این آنتی بیوتیک، استافیلوکوک های کوآگولاز منفی مقاوم به وانکومایسین مشاهده گردید (۳,۴).

درمان عفونت های حاصل از استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین از سال ها قبل مورد توجه قرار گرفت تا این که حدود ۴۰ سال قبل وانکومایسین جهت درمان معرفی گردید و نتایج حاصل از استفاده از این آنتی بیوتیک رضایت بخش بود. پنج سال بعد از استفاده از وانکومایسین در ژاپن، سوش های MRSA دارای حساسیت کمتر به این آنتی بیوتیک جدا گردیدند (۵).

براساس گزارش NCCLS^۱ استافیلوکوک که حساسیت آن به وانکومایسین کم گشته به عنوان VISA^۲ شناخته می شود و توسط غلظت ۸ تا ۱۶ میکروگرم در

1- National committee for clinical laboratory standards (NCCLS).

2- Vancomycin - intermediate Staphylococcus aureus (VISA).

۰/۱۹۵ میکروگرم در میلی لیتر تا ۵۰ میکروگرم در میلی لیتر بود. تعیین MIC براساس روش توصیه شده NCCLS صورت می پذیرفت و پایین ترین غلظت آنتی بیوتیک که رشد چشمی قابل ملاحظه ای از باکتری ایجاد نمی نمود، به عنوان MIC یادداشت می گردید.

روش کار

در این بررسی از مهر ماه سال ۱۳۸۰ به مدت ۶ ماه نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس ارسالی به آزمایشگاه های دو بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه اول ۵۰ مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) و گروه دوم به همان تعداد نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های مختلف بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) بودند.

نتایج

تمام استافیلوکوکوس های انتخاب شده جهت آزمایش تعیین MIC نسبت به متی سیلین مقاوم بودند از ۵۰ باکتری جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، ۱۶ مورد MIC معادل ۳/۱۲۵ مورد MIC معادل ۶/۲۵ و ۴ مورد MIC معادل ۱۲/۵ میکروگرم در میلی لیتر داشتند.

در باکتری های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج)، ۱۸ نفر دارای MIC معادل ۳/۱۲۵ و ۳۱ مورد MIC معادل ۶/۲۵ و ۱ مورد MIC معادل ۱۲/۵ میکروگرم در میلی لیتر بودند.

آزمون آماری کای دو تفاوت معناداری را بین مقاومت استافیلوکوکوس های جدا شده از دو بیمارستان نشان نداد.

بحث

در سال ۱۹۹۸ در آلمان MIC باکتری های MRSA نسبت به وانکومایسین را ۸ میکروگرم در میلی لیتر گزارش نمودند ولی در سال ۱۹۹۹ در یک بررسی برروی سوش هایی از استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین که در نقطه دیگری از این کشور صورت گرفت، مقاومت نسبت به وانکومایسین در مقایسه با سوش های جدا شده در سال

ابتدا از نمونه های دریافت شده کشت به عمل آمد. چنانچه عامل عفونت پس از آزمایشات تشخیصی و تکمیلی استافیلوکوکوس اورئوس بود، باکتری جهت بررسی حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک هایی مختلف از جمله متی سیلین و وانکومایسین مورد آزمایش قرار می گرفت. از نمونه های بدست آمده ابتدا تست حساسیت به روش دیسک دیفیوژن (روش توصیه شده NCCLS) انجام شد و پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت اینکوبیشن، قطر منطقه عدم رشد مطابق جدول استاندارد NCCLS تفسیر گردید. سپس میزان حساسیت به روش tube-dilution یا MIC جهت آنتی بیوتیک وانکومایسین مورد بررسی قرار گرفت.

جهت MIC از پودر آنتی بیوتیک لشو فلیزه وانکومایسین متعلق به شرکت Gmbh & Co.KG آلمان استفاده گردید. ابتدا رقت ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر به عنوان محلول ذخیره تهیه گردید و در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد در شیشه های رنگی نگهداری می شد. رقت های مورد نیاز جهت آزمایش از این محلول ذخیره روزانه تهیه می گردید. غلظت آنتی بیوتیک جهت MIC از

آنٹی بیوتیک ها که هنوز مقاومت بالایی در باکتری ها نسبت به آن ها مشاهده نمی شود را در مراحل عفونت با باکتری های مقاوم به اکثر آنتی بیوتیک ها مورد استفاده قرار داد.

با عنایت به این موضوع که در سال ۱۳۷۷ در مشهد فقط یک مورد استافیلوکوک مقاوم مشاهده گردید این افزایش MIC در باکتری ها پس از گذشت سه سال (که در این میان یک بار دیگر کنترل حساسیت به عمل آمده است) زنگ هشداری برای استفاده صحیح ترا این آنتی بیوتیک می باشد. در نتیجه توصیه می شود جهت جلوگیری از افزایش مقاومت در باکتری ها در درمان بیماران، به نتیجه آنتی بیوگرام ارسال شده از آزمایشگاه ها توجه ییشتی صورت پذیرد.

منابع

1. Hiramatsu K. The emergence of *Staphylococcus aureus* with reduced susceptibility to vancomycin in Japan. Am J Med 1998; 104: 7-10.
2. اصطبهاناتی گ. بررسی بالینی و اپیdemiolوژیک استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین جدا شده از کشت خون یخش مراقبت های ویژه نوزادان در ۱۰۰ مورد [پایان نامه]. مشهد: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ ۱۳۷۷.
3. Giacometti A. Mupirocin prophylaxis against methicillin – susceptible, methicillin – resistant, or vancomycin - intermediate *Staphylococcus epidermidis* vascular-graft infection. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 2842- 44.

۱۹۹۸ و سوش های جدا شده از ژاپن دارای MIC کمتری بودند (۱۷). این مطلب به خوبی سیاست درمان در بیمارستان ها و استفاده صحیح یا نابجا از این آنتی بیوتیک را نشان می دهد. در اکثر مطالعات مشاهده می شود که باکتری های MRSA نسبت به وانکومایسین بالا رفته است اما در فرانسه یک مورد استافیلوکوک حساس به متی سیلین از بیمار مبتلا به کنڑ کتیویت که قبل از وانکومایسین نیز دریافت ننموده و MIC بالایی را نسبت به وانکومایسین نشان می داد، مشاهده شده است (۱۵).

مقایسه نتایج MIC حاصل از دو بیمارستان مورد مطالعه نشان می دهد که نه تنها در بخش سونخنگی بیمارستان امام رضا(ع) به میزان وسیعی از وانکومایسین استفاده گردیده و باعث شده که MIC در مقایسه با سال های گذشته افزایش یابد بلکه در بیمارستان قائم نیز با توجه به این که در سال ۱۳۷۹ نمونه های جدا شده از این بیمارستان نیز کنترل گردیده اند ولی باز افزایش MIC نسبت به وانکومایسین در یک مورد از باکتری های جدا شده مشاهده گردید.

اصولاً نتیجه آنتی بیوگرام در مناطق جغرافیایی مختلف با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا این موضوع تحت تأثیر عواملی نظیر چگونگی مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان ها و در جامعه است.

نظر به این که احتمال افزایش مقاومت به وانکومایسین روز به روز افزایش می یابد، بهتر است که سعی نمود تا در بخش ها از جایگرین شدن این گونه باکتری های مقاوم ممانعت به عمل آورده شود. همچنین در صورت امکان با توجه به نتیجه آنتی بیوگرام انجام شده در آزمایشگاه از سایر آنتی بیوتیک ها استفاده گردد و این گونه

4. Schwalbe R S. Emergence of vancomycin resistance in coagulase negative staphylococci. *N Engl J Med* 1987; 316: 927-31.
5. McCormick MH. Vancomycin a new antibiotic: chemical and biological properties. *Antibiotics Annual* 1956; 64: 601-11.
6. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. 4th ed. 1997.
7. Hiramatsu K. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* clinical strain with reduced vancomycin susceptibility. *J Antimicrob Chemoter* 1997; 40: 135-36.
8. Centers for Disease Control and Prevention. *Staphylococcus aureus* with reduced susceptibility to vancomycin United States. *Morb Mortal Weekly Rep* 1997; 46: 765- 66.
9. Ploy M. First clinical isolate of vancomycin intermediates *Staphylococcus aureus* in a French hospital. *Lancet* 1998; 351: 1212-16.
10. Kim MN. Vancomycin intermediate *Staphylococcus aureus* in Korea. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 3879-81.
11. Trakulsomboon S. First report of methicillin – resistant *Staphylococcus aureus* with reduced susceptibility vancomycin in Thailand. *J Clin Microbiol* 2001; 39: 591-95.
12. Marches A. Heterogeneous vancomycin resistance in methicillin resistant *Staphylococcus aureus* strains isolated in a large Italian hospital. *J Clin Microbiol* 2000; 36: 866-69.
13. Hamilton – Miller, J M. Vancomycin resistant *Staphylococcus aureus*: a real and present danger. *Infect* 2002; 30: 118- 24.
۱۴. شاهنده ز. بررسی خارج نمودن پلاسمیدهای عامل مقاومت از استافیلوکوک های مقاوم به آنتی بیوتیک با استفاده از حرارت ۴۳/۵ درجه سانتی گراد [پایان نامه کارشناسی ارشد]. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ ۱۳۷۹.
15. Alghaity AA. Nasal carriage and antibiotic resistance of *Staphylococcus aureus* isolates from hospital and non-hospital personnel in Abha, Saudi Arabia. *Trans Soc Trop Med Hyg* 2000; 94: 504-7.
16. Alborzi A, Prevalance and pattern of antibiotic sensitivity of methicillin – sensitive and methicillin resistant *Staphylococcus aureus* in Shiraz. *Iran J Med Sci* 2000; 125: 1-8.
17. Bierbaum, G. Presence of *Staphylococcus aureus* with reduced susceptibility to vancomycin in Germany. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1999; 18: 691-96.
18. Bobin-Dubreus S. Clinical isolated of vancomycin hertointermediate *Staphylococcus aureus* susceptible to methicillin and in vitro selection of a vancomycin-resistant derivative. *Antimicrob Agents Chemoter* 2001; 45: 349-52.